Модели популяционной динамики

Ризниченко

Галина Юрьевна,
проф. каф. Биофизики
Биологического ф-та
МГУ, тел. (095)9390289;

E-mail:

riznich@biophys.msu.ru

Популяционная динамика –
математический полигон

Г.Ю. Ризниченко

ЛЕКЦИИ

по математическим моделям
в биологии

ЧАСТЬ I

R&C
Dynamics

БИОФИЗИКА
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ

Г. Ю. Ризниченко

ЛЕКЦИИ

по математическим
моделям в биологии

R&C
Dynamics

Ю.М.Романовский,
Н.В.Степанова,
Д.С.Чернавский

Математическая
биофизика

1975

1984

2004

Потребность в определенности –
естественная биологическая
потребность человека,
но она же – порок мышления

Динамика биржевых индексов

Мы живем не в
Среднестане, а в
Крайнестане

Ниссим Николас Талеб

- Некоторые думают , что я призываю не строить прогнозов и не пользоваться моделями. На самом деле я говорю: «не пользуйтесь линейными прогнозами при опасности колоссальных погрешностей...

Нассим
Николас
Талеб

О секретах устойчивости

По следам «Черного лебедя»

Введение. Об изоморфизме законов природы

I. Модели роста отдельной популяции

1. Понятие эволюции (роста)

- 2. Экспоненциальный рост. Мальтус.
- 3. Логистический рост. Ферхюльст
- 4. Дискретные модели. Динамический хаос
- 5. Роль запаздывания, пространства и случайных факторов
- 6. Рост популяции человечества

II. Модели взаимодействия видов

1. Взаимная синхронизация систем с запаздыванием (2 взаимодействующих региона, две фирмы)
2. Вольтерровские модели
 - Хищник-жертва
 - Конкуренция
 - Симбиоз
 - 2. Обобщенные модели взаимодействия видов
 - 3. Пространственно-временная динамика

III. Примеры простых моделей

1. Юрий Исаакович Неймарк. Модель «производители- продукт-управленцы»
2. Дмитрий Сергеевич Чернавский.
Базовая модель рыночной экономики в закрытом обществе

Изоморфизм —

ОСНОВА

МОДЕЛИРОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Математика – ЯЗЫК

Д. У. Гиббс Josiah Willard Gibbs;
1839—1903) — американский физик,
физикохимик, математик и механик, один из
создателей векторного анализа,
статистической физики, математической
теории термодинамики,

- словарь и звуковые и графические способы кодирования слов - числа, векторы, матрицы, функции
- Грамматики – действия с ними: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование, интегрирование
- Грамматики математического языка – не только правила сочетания элементов (слов), но и правила преобразования одних слов в другие
- Аналог словесных описаний – математические модели

Галилео Галилей
(1564 - 1642)

«... Великая книга природы написана математическими символами»

ИЗОМОРФИЗМ

- **Изоморфизм** (от др.-греч. ἴσος — «равный, одинаковый, подобный» и μορφή — «форма»)

ХИМИЧЕСКАЯ Энциклопедия: **ИЗОМОРФИЗМ** (от изо... и греч. morphe - форма, вид), способность [атомов](#), [ионов](#) или [молекул](#) замещать друг друга в кристаллич. структурах. В результате изоморфизма образуются твердые р-ры замещения. В-ва, к-рым присущ изоморфизм, наз. изоморфными.

- **ИЗОМОРФИЗМ**, в КРИСТАЛЛОГРАФИИ сходство структур кристаллов у различающихся между собой химических соединений.
- Лингвистика **Изоморфизм** - Параллелизм в организации звуковой и смысловой сторон языка
- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ. Энци. **ИЗОМОРФИЗМ** - [соответствие](#) ([отношение](#)) между объектами или системами объектов, выражающее в некотором смысле тождество их строения.

Операционные системы

Совокупность элементов (слов) и действий (грамматика) – операционная система

Две операционные системы изоморфны. Если установлено взаимно однозначное соответствие, между их элементами и действиями

В разных
операционных
системах
действия
выполняются
по-разному.

Пример: в арабской системе записи
числа перемножить легко, а в римской
– очень трудно

В системе Хевисайда легко дифференцировать и интегрировать, но трудно перемножать

- О́ливер **Хэвисайд** (англ. Oliver Heaviside; 18 мая 1850 — 3 февраля 1925) — английский учёный-самоучка, инженер, математик и физик. Впервые применил комплексные числа для изучения электрических цепей, разработал технику применения преобразования Лапласа для решения дифференциальных уравнений

Операционная система компьютера

все действия выполняются
легко и быстро
(правда, приблизительно)

Три кита современной науки

Пейзажи, полученные с помощью
компьютерных грамматик. Галерея
Олега Кислюка

<http://www.fiztech-usa.net/kislyuk/>

Владимир Иванович Вернадский

(1863-1945)

«Большая часть научной работы заключается в поиске математических соотношений.

Найдя их, наш ум успокаивается, и нам кажется, что вопрос, который нас мучил, решен.»

Модели в науках

- Физика – от Галилея и Ньютона
- Язык законов физики – математика

- Химия – 20 век
- химическая кинетика, квантовая химия,

- Конец 20 века - молекулярное моделирование

Модели в биологии

- До половины 20 века – отдельные модели-анalogии:

- Модели популяций
- Математическая генетика
- Модели кровообращения (Бернулли)
- Механические модели движения

- 2-я половина 20 века.

- Качественные (базовые)
- нелинейные модели.
- Модели популяционной динамики
- Клеточные автоматы

- Молекулярное моделирование
- Агентное моделирование

- 21 век – модели сложных систем
- Модели в социальных науках

Figure 8.1 Biological networks. (a) Network of protein–protein interactions in yeast. From Jeong et al. [4]. (b) Regulatory interactions between *E. coli* genes. Genes shown as colored segments associated with the structural description of the gene's main function. Curve colors express the nature of relation (red: inhibition, blue: activation, green: dual regulation), and the traces around the circle indicate autoregulation. Courtesy of S. Ortiz, L. Rico, and A. Valencia.

Systems biology. A Textbook.
Klipp et al.

Модели в биологии

Ось Времени

Молекулярное
моделирование

21 век – модели сложных систем

2000

Молчанов.
Школы – с
1973 г.

Ляпунов, 1972

Тьюринг, 1952

Вольтерра, Лотка , 1926

1900

Ферхюльст, 1848, логистическая кривая

1800

Мальтус, 1798

Фибоначчи, 13 век

2-я половина 20 века.
Качественные (базовые)
нелинейные модели
Молекулярное
моделирование
(Карплюс, 1971)

Изоморфизм законов в системах разной природы

- Геометрический изоморфизм – древние греки
Подобие геометрических фигур
- Физика - Гармонический осциллятор:
- маятник (шарик на закрепленной нити)
- шарик на пружинке
- электрический колебательный контур

Фазовые портреты модели Лотка

Изоморфизм

Волны в модели сердца

Система Белоусова-Жаботинского

галактики

Герман Хакен
Род. 1927

Автор термина
«синергетика»

Синергетика Изоморфизм законов самоорганизации

Теория динамических систем

- Нелинейная динамика
- Теория хаоса
- Теория фракталов
- Nonlinear science
- Science of complexity

цель которых – понять суть и общность
нелинейных процессов в сложных системах

Илья Романович
Пригожин
1917-2003

Параллельно развивались компьютеры и информационные технологии

Сергей Павлович
Курдюмов
1929-2004

С.П. КУРДЮМОВ

РЕЖИМЫ
С ОБОСТРЕНИЕМ
ЭВОЛЮЦИЯ
ИДЕИ

Основания синергетики

Основные свойства нелинейных систем

- Мультистационарность

- Колебания

- Хаос

- Пространственно
- -временные структуры.
- Автоволновые
- процессы

Изоморфизм

• 1. Изоморфизм элементов и их соотношений

- Конкуренция– взаимное угнетение
- Конкуренция биологических видов за пищу и места обитания
- Конкуренция фирм, производящих продукт, за покупателя
- Конкуренция политических партий за власть

• 2. Сходство паттернов

- Зависимость скорости роста от численности имеет макс
- Колебания численности насекомых, грызунов, вспышки численности
- Бумы и спады в экономике. Хаотическое поведение биржевых индексов

χαος

CHAOS

Александр
Юрьевич
Лоскутов
1960-2011

Weather

Э.Лоренц

Chemical
Kinetics

BZ-reaction

Белоусов и
Жаботинский

Heart rythm

Биржевые
индексы

Численность мух *Lucilia* в популяционном ящике (Nicholson, 1954)
1 – взрослые особи. Крестики – число яиц, отложенных за один
день

Изоморфизм законов взаимодействия

- Близкодействующая активация и дальнедействующее ингибирование приводят к пространственной неоднородности
- формирование окраски шкур животных,
- формирование городских анклавов

Алан Тьюринг
1912-1954

Turing A.M. The chemical basis of morphogenesis.
Phil.Trans.R.Soc. London B, 1952

$$\frac{\partial x}{\partial t} = P(x, y, r) + D_x \frac{\partial^2 x}{\partial r^2}$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = Q(x, y, r) + D_y \frac{\partial^2 y}{\partial r^2}$$

Раскраска шкур животных
J. Murray

Форма раковин
Mainhardt

Колонии бактерий
М.А.Цыганов, А.А.Полежаев

Пространственные структуры

Перевод 1-го (2009) и 2-го (2011) тома Д.Мюррей. Изд. РХД

Джеймс Д. Мюррей – профессор университетов Вашингтона и Оксфорда, член Королевского научного общества Великобритании и иностранный член Французской Академии наук, имеет почетные звания многих университетов мира. Автор более 200 научных статей и нескольких книг, основатель и директор Центра математической биологии университета в Оксфорде.

Джеймс Мюррей
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ

БИОФИЗИКА
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ

Джеймс Мюррей
**МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
БИОЛОГИЯ**

ТОМ 1: ВВЕДЕНИЕ

Распространение волны в системах с диффузией

Модель Петровского-Колмогорова- Пискунова

Иван
Георгиевич
Петровский
1901-1973

Колмогоров А.Н., Петровский Н.Г., Пискунов Н.М.

Исследование уравнения диффузии, соединенной с возрастанием вещества, и его применение к одной биологической проблеме. Бюл. МГУ, Сер. Математика и механика. 1937

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + f(C)$$

Андрей
Николаевич
Колмогоров,
1903-1987

а
Функции
правой
части

Модель распространения доминирующего вида
Распространение пламени
Распространение слухов

$$\lambda_0 = 2\sqrt{D \cdot f'(0)}$$

Модели роста популяции

Популяционная динамика – «математический полигон»

- 1. Модель Фибоначчи
- 2. Экспоненциальный рост. Мальтус.
- 3. Логистический рост. Ферхюльст
- 4. Дискретные модели. Динамический хаос
- 5. Роль запаздывания, пространства и случайных факторов
- 6. Рост популяции человечества

Ряд Фибоначчи

Leonardo Pisano
1170-1250
«Книга абака»

Fibonacci -
сын Боначчи
или
«Удачливый»

Леонардо из Пизы («Трактат о счете», 13 век)

Модель экспоненциального роста Мальтуса («О росте народонаселения» 1798)

$$N_{t+1} = qN_t$$

$$N_{t+1} = q^n N_0$$

$$\frac{dx}{dt} = rx.$$

Уравнение логистического роста (Ферхюльст, 1845)

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

r – константа скорости роста
 K – емкость экологической
ниши

K – системный фактор

Ограниченный рост (уравнения Ферхюльста)

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

a

Жук *Rhizoretha dominica* в 10-граммовой порции пшеничных зерен, пополняемых каждую неделю (Crombie, 1945).

б

Водоросль *Chlorella* в культуре (Pearsall, Bengry, 1940)

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

Кривые пополнения

Наименьшая критическая численность

$$\frac{dx}{dt} = a \frac{\beta x^2}{\beta + \tau x} - dx - \delta x^2$$

Рост человечества. Капица. 2004

Нелинейный мир

Поголовье овец, тыс.

Причины, обуславливающие тип динамики популяции:

- Собственные свойства популяции
- Изменение параметров окружающей среды
- Взаимодействие видов

a Квадратичное отображение

$$N_{t+1} = aN_t(1 - N_t)$$

б

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

в Уравнение Ферхюльста

Бифуркационная диаграмма перехода к хаосу через удвоение периода

Переход к хаосу через удвоение периода

Дискретное логистическое уравнение

- Монотонный рост
- Колебания
- Детерминированный хаос

$$N_{t+1} = N_t \exp \left\{ r \left(1 - \frac{N_t}{K} \right) \right\}$$

Модель динамики численности насекомых (при большом r – вспышки)

A.Hastings, K.Higgins. Persistence of transients in spatially structured ecological models Science, 1994, 263, 1133-1136.

Число особей в популяции в момент $t-1$

Взаимодействие видов

File:Male Lion and Cub Chitwa South Africa Luca Galuzzi 2004.JPG

Vito Volterra. Lecons sur la Theorie
Mathematique de la Lutte pour la Vie.
Paris, 1931).

Русский перевод книги Вольтерра вышел
в 1976 г. под названием:
«Математическая теория борьбы за
существование»
М., Наука, 1976 Изд. РХД, 2004

Послесловие Ю.М. Свирежева,
в котором рассматривается история
развития математической экологии в
период 1931-1976 гг.

Классификация типов взаимодействий в терминах параметров уравнений

- N_1 – численность одного вида
- N_2 - численность другого вида
- a_i - коэффициенты собственной скорости роста видов,
- c_i - константы самоограничения численности (внутри видовой конкуренции)
- b_{ij} - константы взаимодействия видов, $(i, j=1,2)$.

$$\frac{dN_1}{dt} = a_1 N_1 + b_{12} N_1 N_2 - c_1 N_1^2,$$
$$\frac{dN_2}{dt} = a_2 N_2 + b_{21} N_1 N_2 - c_2 N_2^2$$

ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИДОВ

$$\frac{dN_1}{dt} = a_1 N_1 + b_{12} N_1 N_2 - c_1 N_1^2,$$

$$\frac{dN_2}{dt} = a_2 N_2 + b_{21} N_1 N_2 - c_2 N_2^2$$

СИМБИОЗ	+	+	$b_{12}, b_{21} > 0$
КОММЕНСАЛИЗМ	+	0	$b_{12} > 0, b_{21} = 0$
ХИЩНИК-ЖЕРТВА	+	-	$b_{12} > 0, b_{21} < 0$
АМЕНСАЛИЗМ	0	-	$b_{12} = 0, b_{21} < 0$
КОНКУРЕНЦИЯ	-	-	$b_{12}, b_{21} < 0$
НЕЙТРАЛИЗМ	0	0	$b_{12}, b_{21} = 0$

Уравнения КОНКУРЕНЦИИ

$$\frac{dx_1}{dt} = x_1(a_1 - b_{12}x_2 - c_1x_1),$$

$$\frac{dx_2}{dt} = x_2(a_2 - b_{21}x_1 - c_2x_2)$$

Межвидовая
конкуренция

Условие сосуществования ВИДОВ

$$\frac{a_1 b_{12}}{c_2} < \frac{a_2 c_1}{b_{21}}$$

- a_i - коэффициенты собственной скорости роста видов,
- c_i - константы самоограничения численности (внутри видовой конкуренции)
- b_{ij} - константы взаимодействия видов, ($i, j=1,2$).

Если $a_1 = a_2$ $b_{12} b_{21} < c_1 c_2$,

Модель А.Н.Колмогорова (1935);

Колмогоров А.Н. Качественное изучение математических моделей динамики популяций. // Проблемы кибернетики. М., 1972, Вып.5.

$$\frac{dx}{dt} = k_1(x)x - L(x)y,$$

$$\frac{dy}{dt} = k_2(x)y.$$

Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987)

великий советский [математик](#), один из основоположников современной [теории вероятностей](#). Им получены фундаментальные результаты в [топологии](#), [математической логике](#), [теории турбулентности](#), [теории сложности алгоритмов](#) и ряде других областей математики и её приложений. Много сделал для математического образования и популяризации математики.

Фазовые портреты в модели Колмогорова

Функции хищничества

Классификация Холлинга

$$\frac{dx}{dt} = k_1(x)x - L(x)y,$$

$$\frac{dy}{dt} = k_2(x)y.$$

1 – линейная функция
(кусочно-линейная)

$$L(x) = b(1 - e^{-ax})$$

2 – насыщение хищника

$$L(x) = \frac{bx}{1 + cx}$$

$$L(x) = \frac{bx^2}{1 + ax + cx^2}$$

3-альтернативный источник
питания или наличие убежищ
жертв

**МакАртур
Роберт**
(MacArthur Robert,
1930-1972)

Американский
биолог, эколог.
Работы по
динамике
популяций и
разнообразию
экологических
сообществ

Модель Розенцвейга- Макартура (1965)

$$\frac{dx}{dt} = f(x) - \Phi(x, y),$$

$$\frac{dy}{dt} = -ey + k\Phi(x, y),$$

**Розенцвэйг
Майкл Л.**
(Rosenzweig
Michael L.)

Профессор.
Университета
Аризона, США
основатель и
главный редактор
журнала
“Evolutionary
Ecology” (с 1986)

А.Д. Базыкин

Биофизика взаимодействующих популяций. М., Наука, 1985;

Нелинейная динамика

взаимодействующих

популяций. М., ИКИ, 2003

Nonlinear dynamics of interacting populations. World Scientific. 1998

$$\frac{dx}{dt} = Ax - \frac{Bxy}{1 + px} - Ex^2,$$

$$\frac{dy}{dt} = -Cy + \frac{Dxy}{1 + px} - My^2.$$

Александр Дмитриевич

Базыкин

1940-1954

Российский биолог и
биофизик

Работы по динамике
популяций

Модель Базыкина в безразмерных переменных

$$x \rightarrow (A/D)x; \quad y \rightarrow (A/D)y; \quad t \rightarrow (1/A)t; \quad \gamma = c/A;$$
$$\alpha = PD/A; \quad \varepsilon = E/D; \quad \mu = M/B$$

$$\frac{dx}{dt} = x - \frac{xy}{1 + \alpha x} - \varepsilon x^2,$$

$$\frac{dy}{dt} = -\gamma y + \frac{xy}{1 + \alpha x} - \mu y^2$$

Модель Колмогорова

$$\frac{dx}{dt} = k_1(x)x - L(x)y,$$

$$\frac{dy}{dt} = k_2(x)y.$$

Набор фазовых
портретов
системы
возможных в
конечной части
первого
квадранта и
соответствующи
х областям
1 - 10
параметрическо
го портрета
(Базыкин, 1985)

Фазовые портреты изображены в
положительном двуугольнике сферы
Пуанкаре. Бесконечность
отображается на внутренность сферы
конечного радиуса

Странный
аттрактор в
системе
хищник – две
жертвы

$$\begin{aligned} \frac{du_1}{dt} &= u_1(\alpha_1 - u_1 - 6u_2 - 4u_3), \\ \frac{du_2}{dt} &= u_2(\alpha_2 - u_2 - u_1 - 10u_3), \\ \frac{du_3}{dt} &= u_3(-1 + 0.25u_1 + 4u_2 - u_3). \end{aligned}$$

Система, описывающая взаимодействие трех видов: хищник - две жертвы (А.Д. Базыкин, Е.Апони́на, Ю.Апони́н, 1985). При уменьшении параметра скорости роста первой жертвы происходит усложнение траектории (последовательное удвоение предельного цикла) $a - г$. Колебательная динамика переходит в квазистохастическую

Переход к хаосу через удвоение периода

Устойчивое решение

Циклы длины 2k

Динамический хаос

$$N_{t+1} = N_t \exp \left\{ r \left(1 - \frac{N_t}{K} \right) \right\}$$

Модели замкнутых экосистем

В.В.Алексеев, Крышев И.И.,
Сазыкина Т.Г.

Физическое и математическое
моделирование экосистем

**Вячеслав Викторович
Алексеев (1940-2007)**

Физик, эколог, геофизик.
Динамика процессов в
замкнутых экосистемах.
Возобновляемые
источники энергии

Схема потоков вещества по трофическим пирамидам в замкнутой экосистеме

$$\sum_{i,k} M_i^k + M_{II} = M$$

Области стохастичности (штриховка) для системы два хищника – две жертвы

**Александр Юрьевич
Лоскутов**
(1960 – 2011)

В.В.Алексеев, А.Ю.Лоскутов. О возможности управления системы со странным аттрактором. Проблемы экологического мониторинга, 1985

Малхов Хорст
(Malchow Horst) –
немецкий ученый,
профессор,
университета
Оснабрюкке. Декан
факультета
сложных систем

Колебания и пространственный хаос

Подвижности видов
(коэффициенты диффузии)
одинаковы (не Тьюринг)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u(1-u) - \frac{u}{u+H} v,$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + k \frac{u}{u+H} v - mv,$$

Зададим малые возмущения

u

Малые возмущения динамической системы в пространстве дают динамический хаос

$$u(x, t) = u_3,$$

$$v(x, 0) = v_3 + [\varepsilon(x - x_0) + \delta].$$

$$\delta = 0,01, \varepsilon = 0,0004, x_0 = 0$$

$a - t = 500, б - t = 1000, в - t = 2000$

Petrovskii S.V. and Malchow H. A minimal model of pattern formation in prey-predator system. *Math. Comput. Modelling* **29**: 49-63, 1999

а – $t=500$, б – $t=1000$,
в – $t=2000$

Пространственный хаос

Фазовый портрет в точке $x=480$ после того, как хаотическое поведение охватило весь ареал

В распределенной системе процессы переноса приводят к хаотизации поведения всей системы

Подавление хаоса и управление хаосом

А.Ю.Лоскутов,
А.С.Михайлов.
Основы теории
сложных систем

ИКИ-РХД, 2007

Модель Ю.И.Неймарка

производители

управленцы

$$F = g \left(\frac{1 + \varepsilon_1 y}{1 + \varepsilon_2 y} \right) \left(\frac{x}{1 + \delta z} \right) - hx - ky.$$

Продукт

$$\frac{dx}{dt} = (a - bx - ly + cz)x, \quad \frac{dy}{dt} = (-d - ey + fz)y,$$

$$\frac{dz}{dt} = \begin{cases} F, & z \geq 0, F > 0, \\ 0, & z = 0, F < 0, \end{cases}$$

Типы общества

Накопленный продукт

Нестабильное общество с высоким уровнем развития

Накопленный продукт общества

Функция потребления (Чернавский)

Функция
Хищничества
Холлинга

$$L(x) = \frac{bx^2}{1 + ax + cx^2}$$

P – доход
 Q – спрос

U – накопления в условных единицах

Модель экономики России.

9 групп населения с разной структурой доходов
Распределение элиты по доходам и затратам

Чернавский Д. С.,
Старков Н. И., Малков
С. Ю., Коссе Ю. В.,
Щербаков А. В.

Об эконофизике и ее
месте в современной
теоретической эконо-
мике // УФН, 2011. –
Т. 181. – С. 767–773

Операционная система мозга

Законы природы

- Природа (общество) – тоже операционная система. Её удастся представить с той или иной полнотой в виде разнообразных элементов и связей между ними и текущим временем.
- Это представление и называется **«законами природы (общества)»**.
- Когда удастся построить изоморфную объекту природы математическую модель, мы постигаем и природный объект

«Все может надоест, кроме понимания» Вергилий

Бюст **Вергилия** у
входа в его склеп в Неаполе
Имя при рождении:
Публий Вергилий Марон
Дата рождения:
15 октября [70 до н. э.](#)
Место рождения: Мантуи
Дата смерти:
21 сентября [19 до н.э.](#)
Род деятельности:
древнеримский поэт

Кафедра
биофизики
Биологического
ф-та МГУ

Галина
Юрьевна
РИЗНИЧЕНКО

Спасибо за внимание

2014